FAB 固定液

Formalin-Ammonium Bromide(FAB)Fixative

产品介绍:

固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定剂对细胞和细胞外成分发生物理改变。

FAB 固定液，又称福尔马林溴化铵固定液，是一种酸性固定液，对大脑和脊髓等神经组织的浸银或沁金染色有良好的的媒染效果。

操作步骤:(仅供参考)

1---根据实验的具体要求操作。厚度在 **2-4mm** 的组织厚片至少固定过夜，通常建议控制固定时间在 **2-3** 天。

2---蒸馏水洗两次，每次 **1** 分钟，根据实验要求进行后续操作。

注意事项:

1、FAB 固定液对人体有一定的损害，请在通风好的环境下小心操作，避免吸入。

2、固定时间随样本厚度不同而变化。通常建议取材厚度为 **2-4mm**，一般不建议超过 **6mm**。

3、固定时应添加足量固定液,通常建议为组织体积的 **10** 倍以上。如果容器容量不够，可以在固定过程中更换固定液 **1-3** 次。

4、为了您的安全和健康，请穿戴实验服和一次性手套。

保存温度：**RT** 避光，效期 **1** 年。